

CONDICIONES ESPECIALES PARA LA TOMA DE MUESTRAS DE SANGRE

GLICEMIA, COLESTEROL, TRIGLICÉRIDOS, PERFIL LIPIDICO:

- El personal debe estar en ayuno estricto de 8 a 12 horas, sin ingesta de licor el día anterior.
- La última comida debe ser suave sin grasas ni mucha harina máximo hasta las 7pm del día anterior.
- Recuerde No fumar, No ingerir chicle. pues esto altera la calidad de la muestra.

COLINESTERASA: Ayuno de mínimo 8 horas

CONTACTENOS: (2) 345 1939

PARCIAL DE ORINA Y/O UROCULTIVO

- No tenga relaciones sexuales el día anterior a la toma de muestra.
- Efectúe aseo genital completo con abundante agua y jabón antes de recolectar la muestra.
- Recoja la primera orina de la mañana de la siguiente manera: se debe descartar la primera parte de la micción, para esto debe orinar directamente en el inodoro por uno o dos segundos, y luego empezar a recoger la orina en el recipiente hasta completar tres cuartas partes.
- No recoja la muestra durante el período menstrual.

CONTACTENOS: (2) 345 1939

RECOLECCION DE ESPUTO

- Lávese la boca y dientes únicamente con agua. No utilice crema dental ni enjuagues.
- Tosa profundamente y expectore en un frasco de boca ancha (suministrado por el Laboratorio o adquirido en la farmacia).
- Evite contaminar la muestra con saliva.

CONTACTENOS: (2) 345 1939

ANTÍGENO PROSTÁTICO

- No fumar antes de la realización del examen
- No ingerir bebidas alcohólicas 24 horas antes de la realización del examen
- No montar bicicleta, ni caballo de 3 a 4 días antes de la realización del examen
- No tener relaciones sexuales de 3 a 4 días antes de la realización del examen
- No haber tenido masaje prostático una semana antes de la realización del examen
- No haber tenido diarrea de 2 a 3 días antes de la realización del examen

CONTACTENOS: (2) 345 1939

ANTÍGENO PROSTÁTICO

- No fumar antes de la realización del examen
- No ingerir bebidas alcohólicas 24 horas antes de la realización del examen
- No montar bicicleta, ni caballo de 3 a 4 días antes de la realización del examen
- No tener relaciones sexuales de 3 a 4 días antes de la realización del examen
- No haber tenido masaje prostático una semana antes de la realización del examen
- No haber tenido diarrea de 2 a 3 días antes de la realización del examen

CONTACTENOS: (2) 345 1939